



Spolek Krušnohorských Včelařů
Včelařské centrum LOM

Hlavní jarní prohlídka

TENTO ÚKON NELZE OBEJÍT ANI OŠIDIT

Včelařské předjaří

Přibližné trvání dle kalendáře	Stav vývoje				Včelařova práce
	Vůdčí rostliny			Včelstva	
	druh	doba rozkvětu	Stanoviště	životní projevy	
Od konce února do poloviny dubna	Olše lepkavá	II - III	luhy, pobřeží vodních ploch	Začátek a rozvoj plodování, kapky vody na česně hromadné prolety	sledujeme hromadný prolet včel
	jíva	III - V	pobřežní křoviny, louky		jarní prohlídka
	podběl	III - IV	louky		spojování a přidávání matek
	sněženka	III - V	háje		doplnění zásob
	sasanka lesní	IV - V	háje		zřízení napajedla
					zatavování mezistěn

Důležité mezníky pro rozhodování

**Lze provádět vždy po
hlavním proletu**

**Na prohlídku musíme
být připraveni**

**Provádíme při teplotě
nad 10 st. C**





Cíle prohlídky - znalosti

1. Vždy je hlavní znát cíl, proč vstupujeme do včel
2. Čeho si musí všímat
3. Co je v tu dobu podstatné pro rozhodování
4. Co můžeme udělat, nebo co musíme udělat
5. Pokud jen utíkáme od manželky – nemá cenu včely otvírat

Hlavní prohlídce předchází prohlídka na česnech

- Hromadný prolet, včely se vracejí zpět, nosí pyl. Jsou v pořádku, necháme je na pokoji.
- Když vyletují jen málo a ojediněle, je něco v nepořádku, musíme v příhodné době zjistit příčiny.
- Krouží-li okolo úlu, zmateně pobíhají po česně a stěně úlu, nevracejí se, může to být známkou, že je včelstvo osiřelé.
- Včelstvo skoro nevyletuje, nereaguje na poklep, na česně malátné včely. Jsou pravděpodobně hladové.
- Pokud ale při stejném stavu reagují na poklep silným zahučením, prolet nepotřebují, a vše je v pořádku.



Prolety na česnech jsou důležitou informací o stavu včel

Snažte se být v tu dobu u včel

Hlavní jarní prohlídka včelstev

Musíme ji provést ve správnou dobu

Potřebujeme znát výchozí jarní stav včelstev, abychom jim mohli vytvořit podmínky pro další rozvoj

Teploty ve stínu musí být vyšší než 10 st. C

Provádíme před rozkvětem třešně ptačí, konec března začátek dubna



Co musíme prohlídkou zjistit

1. **Sílu včelstva – měříme obsednutými rámkami, silná obsedají 7 plástů, 5-6 střední, méně jak 5 plástů řadíme mezi slabá**
2. **Stav zásob ve včelstvu – pro dobrý rozvoj potřebují 4 – 5 kg zásob, pyl**
3. **Přítomnost matky – zakladená plocha plodu, pravidelnost, mezerovitost plodu**
4. **Protože se v této době dobře hledá matka, tak jí označíme, pokud jsme to již neudělali dříve**
5. **Vše zaznamenáme**



Tady je jaro v plném proudu

Přesto je jarní prohlídka nutná pro doplnění ostatních informací

Musíme znát odpovědi na otázky:

1. Má včelstvo matku? Jakou?
2. Jsou ve včelstvu vajíčka, otevřený plod?
3. Jak silné je včelstvo?
4. Na kolika plástech má plod?
5. Nemělo by se včelstvo zúžit?
6. Kdy bude potřeba včelstvo rozšířit?
7. Jaké jsou zásoby pylu a medu?
8. Je v úlu pohoda?
9. Jsou to ty naše mírné včely?



[illegible]


ZAZANAMENÁVAT, ZAZNAMENÁVÁT, ZAZNAMENÁVAT

Mimo studium je stále ještě čas připravit sezonu

PRÁCE V DÍLNĚ



DRÁTKOVÁNÍ TROCHU JINAK



Včelí napajedla – v místě kde není voda

ODKAPÁVÁNÍ



NÁDOBY



Pro spolek připravil Petr Tábořský



**Kde je to potřeba
posilujeme
rezervním včelstvem**