



Spolek Krušnohorských Včelařů

Včelařské centrum LOM

www.vcely.cz

Včelařské podletí od poloviny července do konce září

Začátek včelařského roku

Včelařské podletí

Přibližné trvání dle kalendáře	Stav vývoje				Včelařova práce
	Vůdčí rostliny			Včelstva	
	druh	dobu rozkvětu	Stanoviště	životní projevy	
Od poloviny července do konce září	žito ozimé	žně	pole	ochablý let, vyhánění trubců, paběrkování, vylétávání včel, slídilství, loupeže, pokles plodování, přenášení zásob, příprava na zim ^u	odstraňování medníků
	pámelník bílý	VI.-VIII.	parky, volná příroda		záložní včelstva a matky
	světlík lékařský	VII.-VIII.	louky, pastviny		zimování záloh
	slunečnice	VIII.-X.	pole		výměna a přidávání matek
	starček hajní	VII.-IX	lesy, křoviny		plodová zkouška
	jetel luční pravý	2. seč VII.	pole		spojování včelstev
	vojtěška	3. seč IX.	pole		dokrmení
					podzimní prohlídka
					úprava plodiště na zimu
					doplnění zásob na zimu
					ochrana díla
					ukončení chovu

Odstranění medníků

- U slabších a vyrojených včelstev rušíme medníky a zesilujeme včelstva
- Ostatní medníky odstraňujeme nejpozději do konce srpna a to velmi rychle
- Kombinujeme s orientační zimní prohlídkou
- Pozor na loupeže



Záložní včelstva – potřebujeme nyní, ale také na jarní zásah

- Bohužel, pokud chceme dodržet důležitý faktor – zazimovat jen silná a zdravá včelstva, musíme je slučovat se záložními včelstvy
- Ani tak nemáme záruku, že nám všechna přezimují
- Musí nám zůstat dostatek náhradních včelstev ještě na jarní vyrovnaní stavu
- Pesimisté tvrdí, že 100% záložních včelstev bude málo





Zimování záložních včelstev

- Musíme si uvědomit, že u slabších včelstev je potřeba zajistit teplo, které neřešíme u silných včelstev
- Vhodné je zimovat na 5 – 7 plástech, důležité je ukončit včelstvo izolační přepážkou
- Lze zimovat dva až tři nástavky záložních včelstev na sobě, nebo dvě včelstva v jednom nástavku, oddělujeme přepážkou. Umístit můžeme sestavu na jiné zimované včelstvo
- Při odebrání matky lehce včelstva sloučíme



Diagnostika varroázy - postupy

- Je čas zvýšené kontroly proti roztoči – vkládáme kontrolní podložky
- Denní spad nad 10 roztočů je kritický – je potřeba zahájit léčbu
- Nastal konečně čas, kdy máte možnost zvolit variantu léčení, která vám a vašemu chovu více vyhovuje, je již schválena celá řada funkčních prostředků
- Seznam schválených prostředků najdete v metodickém pokynu SVS, spolek ho pravidelně posílá svým odběratelům tiskovin
- Jako vždy, každý z prostředků má svá plus i minus

Podívejme se, jaké
výhody a
nevýhody přivolá
rozhodnutí zůstat
věrný chemii,
která byla
prosazována i
zákonem

KLADY

- Důležitá je určitě snadná práce při aplikaci a to bez rozdílu na používané úly
- Navíc pokud jste členem ČSV, většinu práce za vás vykoná spolek
- Jistě sem patří vysoká účinnost, která přesahuje 90%
- Aplikace, správně použitá, zpravidla nepotřebuje žádné doplňující léčení

ZÁPORY

- Největší problém jsou asi rezidua léčiv, která mohou ovlivňovat produkty i vývoj včely
- Pokud nejste členem ČSV, musíte žádat svého veterináře o předepsání léčiva
- Potřebujete technické vybavení na aplikaci
- Pokud aplikujete v uzavřených včelínech, je to i dráždivý dým, včetně nebezpečí požáru

Porovnáme stejný problém s použitím kyseliny šťavelové

KLADY

- Účinnost je na stejné úrovni jako chemie, více jak 90%
- Je vlastně přirozenou součástí medu
- Neukládají se rezidua
- Pokud dodržíme jednoduché zásady bezpečnosti, je aplikace jednoduchá a bezproblémová
- Je již dlouhodobě používaná ve vyspělých včelařských zemích, bez jakýchkoliv negativ

ZÁPORY

- Po aplikaci probíhají spady podstatně delší dobu a mohou mít vliv na stav roztočů v odevzdané měli
- Při pokapu nutný bezplodový stav ve včelstvu
- Problémy s aplikací do úlů bez přístupu z vrchu

Výměna a přidávání matek

Jak na to?

- Existují desítky „zaručených“ metod, bohužel mají ale jednu nevýhodu, nejsou zaručené
- Přijetí matky ovlivňuje roční období, počasí, snůška a nálada včelstva
- V podletí vyžaduje přidání matky zvláštní opatrnost a péči

Kromě plánované výměny počítáme i s těmito variantami, které budou potřebovat naši pozornost:

- **Bezmatečné** – včelstvo, které osiřelo a má otevřený plod, ze kterého může vychovat novou matku
- **Osiřelé** – včelstvo, které ztratilo matku, nemá plod a nemůže si vychovat novou matku

Varianta přidání matky

- Starou matku izolujeme v mateří klíčce
- Pevně uzavřenou klíčku necháme v poslední uličce před krycím plástem
- Po zestárnutí a zavíčkování plodu nahradíme tuto matku novou matkou, uzavřenou medocukrovým těstem v klíče






Přidání matky přes oddělek

- Pro oddělek používáme zavíčkované plodové plásty
- Necháme odletět doprovodné včely
- Přidáme uzavřenou klíčku s matkou
- Podle nálady včelstev pouštíme matku

Loupeživost




Podzimní prohlídka – nejdůležitější prohlídka

Čemu věnujeme pozornost:

- Ověřujeme přítomnost matky
- Ověřujeme sílu včelstva
- Množství plodu
- Množství zásob
- Definitivně rozhodujeme, která včelstva zazimujeme a která získají statut záložních včelstev

Síla včelstva:



Co musí prohlídka objasnit



Jaké jsou zásoby medu



Jaké jsou zásoby pylu



Jak silný je plod



Zdravotní stav



Doplnění zimních zásob

**Krmení hrubým
krystalem**

Krmení roztoky

**Volně na stanovišti (tzv.
americký způsob)**

Hotové krmné směsi

Zimování na medu

Ochrana díla – uskladnění souší

Co fungovalo kdysi

- Hlavním ochranným prostředkem bylo vysíření souší
- Skladovaly se většinou ve starých skříních, kde se i šířily
- Při teplotách nad 10 st. C se muselo vždy opakovat po 8-10 dnech

Co používáme dnes

- Kupodivu stále funguje šíření
- Novinkou jsou specializované chlazené sklady s regulací vlhkosti
- Nadbytek vzdušné vlhkosti je stejné nebezpečí jako zavíječ
- Vyvarujeme se všech nabídek jedů pro likvidaci zavíječe

Nyní rozhodujeme o
příštím včelařském roku